

Kalp Durması - İleri Yaşam Desteği (Yetişkin)



GÜNCEL

Bilinç kapalı

Solunumu ve nabızı kontrol et
Yaşamsal Belirtileri Değerlendir

•1 soluk/ 5-6 saniyede
•2 dakika da bir nabız kontrolü yap

Nabız var

Solunum yok veya gasping

Solunum ve Nabız Kontrolünü
En fazla 10 saniye de tamamla

Nabız yok

30 kalp masajı / 2 solunum (BVM ile)
Defibrilatör hazır olana kadar
Paramedik yoksa OED)

Ritmi değerlendir

Şok Uygulanabilir
(VF/Nabızsız VT)

Şok Uygulanmaz
(NEA/Asistoli)

**VF / Nabızsız VT
Akış Şeması**

**ASİSTOLİ / NEA
Akış Şeması**

İleri Hava Yolu Yöntemlerini kullanarak havayolunu sağla
(Entübasyon Algoritması)
•Sağlanamıyorsa BVM ile devam et

Entübasyon yapıldıktan sonra KPR;
en az 100 en fazla 120 kalp basısı/
dak ve 10 soluk/dak olarak kesintisiz sürdür

IV veya IO yol aç

Sağlık kuruluşuna yada doktora ulaşana kadar resüsitasyona devam et