Kalp Durması
(Yetişkin)

VF / Nabızsız VT

GÜNCEL

KPR (30/2) Uygula
PBV Oksijen ver
Defibrilatör bağlanana kadar

Ritmi Değerlendir

VF / Nabızsız VT

1.Defibrilasyon 1 Şok
120 - 200 J bifazik veya 360 J monofazik
2sn içerisinde 30/2 KPR devam et (5 döngü veya 2dk)

Ritmi Değerlendir

VF / Nabızsız VT

2. Defibrilasyon 1 Şok 120 - 200 J bifazik veya 360 J monofazik
2sn içerisinde 30/2 KPR devam et (5 döngü veya 2 dak) Damar yolu varsa
KPR sırasında; ADRENALIN 1 mg IV/IO (3-5 dak da tekrarla)

Ritmi Değerlendir

VF / Nabızsız VT

3. Defibrilasyon 1 Şok 120 - 200 J bifazik veya 360 J monofazik
30/2 KPR devam et (5 döngü veya 2 dak)
Damar yolu varsa KPR sırasında;
-AMIODORON 300 mg IV/IO (Tekrarlayan veya Dirençli VF/VT 5. turda 150mg tekrar vermeyi düşün) yoksa %2 Lidokain 1-2 mg x kg

İlgili Ritim Akış Şemasına Git

Ritim değişikliği varsa

Nabız yok

10 saniye süreyle nabzı kontrol et

Nabız var

Resüsitasyon sonrası bakım planla
H ve T° : Hipovolemi, Hipoksi, Hipotermi, Hipo-Hiperkalemi (ve diğer elektrolitler), H⁺ İyonu (asidoz) Tansiyon pnömotoraks, Toksikasyon/ Dozaşımı, İoğu) Tamponad Kardiyak, Tromboz pulmoner

HER AŞAMADA NAKİL

www.egitmenparamedik.com